

## Tab. 2/A - Azioni necessarie per contrastare gli effetti avversi in caso di malattia o scarso benessere

Effetto avverso	Osservazioni	Azioni/Precauzioni
<b>Fame</b>	Perdita di peso (in viaggi lunghi)	Alimentare i suini dentro il veicolo non è raccomandato, dato che soffrono di cinetosi. Il periodo di digiuno in allevamento prima del carico va adattato in base alla durata del viaggio
<b>Disidratazione</b>	Sete estrema, cute raggrinzita, mucose congeste	I suini devono avere un accesso permanente all'acqua durante il viaggio. Fornire acqua fresca, non eccessivamente fredda
<b>Mancanza di comfort durante il riposo</b>	Suini sporchi. L'animale sta sempre in piedi, non vi sono animali sdraiati	Lettiera. Adeguate le dimensioni del recinto in base ai suini trasportati Adeguate la ventilazione, regolando la ventilazione forzata e/o le bocchette laterali
<b>Scarsa ventilazione</b>	Iperventilazione anomala dei suini con bocca aperta e frequenza respiratoria aumentata	Verificare la ventilazione, fornire ventilazione sufficiente ai suini, verificare la temperatura interna. Aprire le bocchette laterali e avviare la ventilazione forzata, se disponibile. Evitare di sostare col veicolo in un'area calda (ad esempio parcheggiando al sole).
<b>Stress da caldo</b>	Affanno	Aprire immediatamente tutte le bocchette laterali e avviare la ventilazione forzata, se disponibile. Può rendersi necessario spruzzare acqua, in condizioni di elevate temperature, per rinfrescare i suini all'interno del veicolo